


おくすりの名前	吸入回数
【エアロスフィア】	1日2回 1回2吸入

《部位の名称》

《残薬の確認方法》

(手技確認における8つのポイント※)

- ※(一社)吸入療法アカデミー方式
 ①デバイス保持(垂直) ②カウンター指差し確認 ③通気口の位置確認 ④ボタン・レバー・カバー操作は最後までしっかり行い指を離す ⑤口角を閉じる ⑥吸い方(ゆっくり深く) ⑦息止め(指折り5つ) ⑧うがいは必ず行う(ガラガラ、ブクブク各3回)



※1 《吸入映像》

(開封時の操作)	(毎日の操作)	(注意点)
(約1分)	(約1分20秒)	(約45秒)

*あなたのウイークポイントにチェック☑していますので参考にしてください。

手順	ポイント
① 薬剤の準備 <input checked="" type="checkbox"/> 開封時は、試し噴霧を(2)回行う <input type="checkbox"/> 薬剤セット時の操作は缶の底が上になるように垂直に持ち行う <input type="checkbox"/> 目盛り(カウンター)で残量確認する <input type="checkbox"/> キャップを外す(両端をつまむ) <input type="checkbox"/> 吸入器をよく振る	・垂直に持ち操作しないと正確な1回分量がセットされない ・<試し噴霧> 開封時(2回/120吸入・4回/28吸入) 洗浄後、1週間以上未使用時は2回行う
② 息吐き <input type="checkbox"/> 無理のない程度に息を吐き一旦止める(吸入口には息を吹きかけない)	・息吐きと吸入をそれぞれしっかりしていただくために、息吐き後一旦息を止め吸入する 呼気量≒吸気量
③ 吸入 <input type="checkbox"/> 缶の底が上になるように吸入口をくわえ、口角を閉じ、息を吸いながら噴霧ボタンを押し、ゆっくり深く、最後まで息を吸い込む	・深呼吸するイメージで(5秒ほど)吸う ・ポンベを押すタイミングで吸えない場合はスパーサーを利用すると良い
④ 息止め <input type="checkbox"/> 吸入器から口を離し、口を閉じ、指折り5つ息を止める(無理のない程度で良い)	・肺により多くの薬を定着させるため
⑤ 息吐き <input type="checkbox"/> 鼻からゆっくりと息を吐く	・口から吐くと速くなることがある
線返し	・吸入口に息を吹きかけないようにする意味も込めて鼻から抜くことが良い ・ステロイドに限っては鼻腔内における抗炎症作用が期待できるとの報告がある 吸入後に鼻から息を吐きだすことで気管支などに定着できなかった薬が鼻の中に定着する その為、吸入後に鼻から息を吐きだすことでアレルギー性鼻炎や好酸球性副鼻腔炎に効果が期待できる
⑥ 後片付け <input type="checkbox"/> キャップをしっかり閉じる	・キャップを閉じる前に吸入口を拭く ・アクチュエーターを週1回洗浄する
⑦ うがい <input type="checkbox"/> 吸入後はガラガラうがい、ブクブクうがいを各3回ずつ行う	・口腔内及び咽頭についた薬を洗い流す

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嚙声などの副作用を防止するため、吸入後すぐにうがいをする
 それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うようにする

企画より著者の許可を得て使用

保険調剤薬局名(薬剤師名) : _____ 年 月 日